



服用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品

イ ス ク ラ けん い か りゅう

イスクラ健胃顆粒S

(生薬製剤)

■特徴

「イスクラ健胃顆粒S」は、トウジン、シュクシャなど8種類の植物性生薬から抽出したエキスを顆粒としたもので、比較的体力がなく、胃腸の働きの弱い方の胃炎、胃腸虚弱、胃痛、腹痛、食欲不振、胃部不快感、腹部膨満感、悪心、下痢の改善を目的としております。

⚠ 使用上の注意



■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者
- (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (5) 次の症状のある人。
むくみ
- (6) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

※裏面もお読みください。

■効能・効果

比較的体力がなく、胃腸の働きの弱いものの次の諸症：胃炎、胃腸虚弱、胃痛、腹痛、食欲不振、胃部不快感、腹部膨満感、悪心、下痢

■用法・用量

次の量を、1日2～3回、食前又は食間に服用してください。

年 齢	1回の服用量	1日の服用回数
成人(15歳以上)	1包	2～3回
15歳未満	服用しないでください。	

●用法・用量に関連する注意

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 本剤は、15歳未満の小児には服用させないでください。

■成分・分量

本品1日量3包(9.0g)中、下記成分及び分量の生薬より製した健胃軟エキスS11gを含有します。

ビャクジュツ	4.68g
ブクリョウ	4.68g
ハンゲ	2.34g
シュクシャ	1.80g
チンピ	1.80g
カンゾウ	1.62g
モッコウ	1.62g
トウジン	2.34g

※添加物としてデキストリン、乳糖を含有します。

■保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。
- (4) この文書は、本剤を服用の際に必要な注意事項等が記載されていますので、大切に保管してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

◎お問合せ先

イスクラ産業株式会社 お客様相談室
〒103-0027 東京都中央区日本橋1-14-2
電 話：03-3281-3363
受付時間：午前9:00から午後5:00まで
(土、日、祝日を除く)

製造販売元

イスクラ産業株式会社

東京都中央区日本橋1-14-2

URL: <http://www.iskra.co.jp/>