



服用に際して、この説明書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品

# 芎帰調血飲第一加減 エキス(細粒)50

(漢方製剤)

## ■特徴

芎帰調血飲第一加減は、日本人の体質に合った処方で知られる一貫堂方で、活血祛瘀剤の代表的なものです。

本方は下剤を配合せず、補剤からなる活血祛瘀剤ですので、産後の体力低下等に用いることができるのが大きな特徴です。

## △ 使用上の注意

### ☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起ころやすくなります)

次の人は服用しないでください。

生後3ヵ月未満の乳児。



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 胃腸が弱く下痢しやすい人
- (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## ■機能・効果

体力中等度以下のものの次の諸症。ただし、産後の場合は体力に関わらず使用できます。:

血の道症、月経不順、産後の体力低下

[効能・効果に関する注意]

血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことです。

※裏面もお読みください。

## ■用法・用量

次の量を、1日3回、食前又は食間に服用してください。  
(食間とは食後2~3時間を持ちます。)

年齢	1回の服用量	1日の服用回数
大人(15才以上)	1包	3回
15才未満7才以上	2/3包	
7才未満4才以上	1/2包	
4才未満2才以上	1/3包	
2才未満	1/4包	

### [用法・用量に関する注意]

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。

## ■成分・分量

本品3包(6.0g)は

トウキ	1.0g	ヤクモソウ	0.75g
ジオウ	1.0g	カンゾウ	0.5g
ブクリョウ	1.0g	トウニン	0.75g
ウヤク	1.0g	コウカ	0.75g
ボタンピ	1.0g	キジツ	0.75g
タイソウ	0.75g	ケイヒ	0.75g
ショウキョウ	0.5g	ゴシツ	0.75g
センキュウ	1.0g	モッコウ	0.75g
ビャクジュツ	1.0g	エンゴサク	0.75g
チンピ	1.0g	シャクヤク	0.75g
コウブシ	1.0g		

芎帰調血飲第一加減水製エキス6.9g(乾燥物換算で約3.45gに相当)を含有する細粒剤です。添加物としてアスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、メタケイ酸アルミン酸Mg、ヒプロメロース、デキストリン、乳糖、トウモロコシデンプン、香料を含有します。

## ■保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。
- (4) 本剤は天然物を成分としていますので、製品により若干色調が異なることがあります、効果には変わりありません。
- (5) 1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折返して保管し、2日以内に使用してください。
- (6) この文書は、本剤を服用の際に必要な注意事項等が記載されていますので、箱に入れて保管してください。
- (7) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

### ◎お問合せ先

イスクラ産業株式会社 お客様相談室

電話：03-3281-3363

受付時間：10:00～12:00、13:00～17:00

(土、日、祝日を除く)

発売元 **イスクラ産業株式会社**

東京都中央区日本橋1-14-2

製造販売元 **松浦薬業株式会社**

名古屋市昭和区円上町24-21