



服用に際して、この説明書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品

イ ス ク ラ りょう かい らく T

# イスクラ涼解楽T

(生薬製剤)

## ■特徴

「イスクラ涼解楽T」は、レンギョウ、キンギンカなど9種類の植物性生薬から構成されております。これらの原料より抽出したエキスを顆粒としたもので、かぜによるのどの痛み・口(のど)の渴き・せき・頭痛の改善を目的としております。

## ⚠ 使用上の注意

### ⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が  
起こりやすくなる)  
短期間の服用にとどめ、連用しないでください。



### ■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 胃腸の弱い人。
- (4) 高齢者。
- (5) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (6) 次の症状のある人。  
むくみ
- (7) 次の診断を受けた人。  
高血圧、心臓病、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。  
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 5～6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

※裏面もお読みください。

## ■効能・効果

かぜによるのどの痛み・口（のど）の渴き・せき・頭痛

## ■用法・用量

次の量を、1日2～3回服用してください。

年 齢	1回の服用量	1日の服用回数
成人(15歳以上)	1包	2～3回
15歳未満7歳以上	1/2包	
7歳未満5歳以上	1/4包	
5歳未満	服用しないでください。	

### ●用法・用量に関連する注意

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 本剤は、5歳未満の乳幼児には服用させないでください。

## ■成分・分量

本品1日量3包(7.2g)中、下記成分及び分量の生薬より製した涼解楽Tエキス末4.7gを含有します。

キンギンカ	4.26g
レンギョウ	4.26g
カンゾウ	2.56g
キキョウ	2.56g
ハッカ	2.56g
ゴボウシ	2.14g
ケイガイ	1.70g
タンズシ	2.14g
タンチクヨウ	1.70g

※添加物として乳糖、ステアリン酸マグネシウムを含有します。

## ■保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5) この文書は、本剤を服用の際に必要な注意事項等が記載されていますので、大切に保管してください。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

### ◎お問合せ先

イスクラ産業株式会社 お客様相談室  
電 話：03-3281-3363  
受付時間：10:00～12:00、13:00～17:00  
(土、日、祝日を除く)

製造販売元

**イスクラ産業株式会社**

東京都中央区日本橋1-14-2

URL：<http://www.iskra.co.jp/>