

服用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。



第2類医薬品

イ ス ク ラ そ う り ょ う こ ぎ く か り ゅ う

イスクラ双料杞菊顆粒

(漢方製剤)

■特徴

「イスクラ双料杞菊顆粒」は、六味丸にキクカ、クコシを加えた処方でこれら8種類の生薬から抽出したエキスを顆粒としたものです。体力中等度以下で、疲れやすく胃腸障害がなく、尿量減少又は多尿で、ときに手足のほてりや口渴がある方のかすみ目、つかれ目、のぼせ、頭重、めまい、排尿困難、頻尿、むくみ、視力低下の改善を目的としております。

⚠ 使用上の注意



■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
 - (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	食欲不振、胃部不快感、腹痛

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

下痢

4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

■効能・効果

体力中等度以下で、疲れやすく胃腸障害がなく、尿量減少又は多尿で、ときに手足のほてりや口渴があるものの次の諸症：かすみ目、つかれ目、のぼせ、頭重、めまい、排尿困難、頻尿、むくみ、視力低下

※裏面もお読みください。

■用法・用量

次の量を、いずれも1日3回、食前又は食間に服用してください。

年 齢	1回の服用量	1日の服用回数
成人(15歳以上)	1包	3回
15歳未満7歳以上	2/3包	
7歳未満4歳以上	1/2包	
4歳未満	服用しないでください。	

●用法・用量に関連する注意

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 本剤は、4歳未満の乳幼児には服用させないでください。

■成分・分量

本品1日量3包(7.5g)中、下記成分及び分量の生薬より製した杞菊地黄エキス11gを含有します。

ジオウ	6.06g
サンシュユ	3.02g
サンヤク	3.02g
タクシャ	2.25g
ブクリョウ	2.25g
ポタンピ	2.25g
キクカ	1.51g
クコシ	1.51g

※添加物としてデキストリン、部分アルファードンテンを含む。

■保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 誤用をさげ、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5) この文書は、本剤を服用の際に必要な注意事項等が記載されていますので、大切に保管してください。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

◎お問合せ先

イスクラ産業株式会社 お客様相談室
〒103-0027 東京都中央区日本橋1-14-2
電 話：03-3281-3363
受付時間：午前9:00から午後5:00まで
(土、日、祝日を除く)

製造販売元

イスクラ産業株式会社

東京都中央区日本橋1-14-2

URL: <http://www.iskra.co.jp/>